



# Adopter les bonnes pratiques de taille après le gel de printemps



Après un épisode de gel de printemps sévère sur le vignoble bergeracois, les ceps peuvent avoir différentes allures. Il est important d'adopter des bons gestes de taille.

Différents constats sont faits cet automne :

- Aoûtement partiel de certains bois.
- Empattements fragiles et risque de casse.
- Risques d'occasionner des plaies de taille conséquentes en supprimant les nombreuses pousses issues des yeux de la couronne ou du vieux bois.
- Difficultés pour choisir une aste (baguette).

## Comment tailler après un épisode de gel sévère ?

Les actions à mener sont à réfléchir au cas par cas, selon le comportement de reprise de végétation qui dépend du niveau de dégât.

Pour la taille de cet hiver, il faut donner la priorité au positionnement du courson. Pour la baguette, on fera avec ce que l'on a, sa position étant moins importante que son aptitude à donner des fruits.

## Choix du bois

Les bois choisis doivent :

- Etre correctement aoûtés ;
- Porter une charge adaptée à chaque souche, en fonction de sa vigueur ;
- Etre suffisamment vigoureux et posséder un empatement solide ;
- Etre bien placés par rapport aux flux de sève.



©Chambre d'agriculture Indre-et-Loire

## Conséquence de l'absence d'ébourgeonnage ou d'épamprage en tête en 2017

Sur les parcelles où l'ébourgeonnage n'a pas été réalisé en 2017, il sera utile de porter une attention particulière lors de l'élimination des nombreuses pousses qui pourrait entraîner des nombreuses plaies de taille et générer du bois mort sur lesquelles les champignons sont susceptibles de s'installer.

## Yeux francs totalement détruits

On observe de nombreux départs des bourillons... Les bois de la couronne ont débourré, il faut être vigilant sur l'empatement pouvant être défectueux. Le choix de la baguette pourra se faire sur des bois de couronne lorsqu'il n'y a plus de bois issu de bourgeons francs laissés.

On peut aussi choisir des bois issus des bourgeons du vieux bois (gourmands). Si leur diamètre est suffisant, les bourgeons de ces sarments ont été initiés et seront fructifères.

Cela peut être l'occasion de reformer le cep.



## Bibliographie

- Chambre d'agriculture Dordogne - Fiche technique - 2015
- Chambre d'agriculture Indre-et-Loire - Fiche technique - 2016
- SICAVAC de Sancerre - Manuel des pratiques viticoles contre les maladies du bois - 2013.

## Rameaux partiellement gelés ? Vérifier la qualité de l'aouêtement

Une accumulation des réserves d'amidon suffisante en saison permet d'avoir un bois de qualité. Le risque, cette année, d'avoir une mauvaise mise en réserve des sucres dans le vieux bois pourrait entraîner une baisse de productivité de ces pieds l'année suivante. De plus, les bois mal aouétés ne supportent généralement pas le froid.

Donner la priorité au courson, nécessaire dans la réflexion pour avoir du bois de taille l'an prochain. Choisir un courson bien orienté avec la position des yeux dans le respect du flux de sève avec un seul œil franc au-dessus de celui que l'on veut voir démarrer.




En cas d'impossibilité de trouver une aste assez longue, il est possible de modifier momentanément le système de taille : on peut alors tailler «à côtés» (codon de Royat). Attention, ce système de taille est moins productif qu'une taille longue, à nombre de bourgeon égal, il convient donc d'adapter la charge, dans le respect des limites du cahier des charges.

## Taille de jeunes plants suite au gel

Si l'on observe des départs mal aouétés, il est préférable de rabattre la taille.

Si les départs sont bien aouétés, il faudra être vigilant sur les flux de sève.



## Quelques règles pour la qualité des plaies de taille

Tailler en laissant des chicots sur bois de plus d'un an. Éviter les grosses plaies de taille rase pour préserver les vaisseaux du vieux bois sous-jacent du dessèchement.

Ne pas supprimer l'empatement.

Encore plus cette année, il est très important de soigner les coupes en limitant les plaies de taille et si possible les positionner au-dessus.



Par contre, si la coupe est trop longue, les yeux de la couronne vont débourrer. Cela nécessitera un ébourgeonnage important.

## Conclusion : l'essentiel des points de vigilance cet hiver

Si l'on observe des départs mal aouétés, il est préférable de rabattre la taille ou tailler à côtés.

Si les départs sont bien aouétés, il faudra être vigilant sur les flux de sève.

- Priorité au positionnement du courson pour la taille de l'année prochaine.
- Conserver l'empatement.
- Attention si l'empatement est fragile : il risque de casser au moment du pliage. Choisir une période humide.
- Bannir toute fertilisation excessive en 2018.
- Nécessité d'un travail d'ébourgeonnage au printemps dans certains cas.
- Essayer de limiter le bois mort qui ne sert à rien.
- Bien adapter la charge à la souche.
- Évitez les traumatismes sur le pied (plaies de taille trop nombreuses, trop rases ou trop grandes).

**IVBD**

Interprofession des Vins de Bergerac et Duras

Rosette  
**Bergerac**  
Montravel Pécharmant  
Monbazillac  
Duras Saussignac

Cette synthèse a été rédigée dans le cadre d'un groupe de travail composé de :

**FVBD**  
Fédération  
des Vins  
de Bergerac  
et Duras

**AGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
DORDOGNE

**IVBD**

Interprofession des Vins de Bergerac et Duras

Adopter les bonnes pratiques de taille après le gel de printemps - Novembre 2017